

	Umidità (%)	Proteine grezze (%)	Fibra grezza (%)	Oli e Grassi grezzi (%)	Ceneri grezze (%)	Amido (%)	aNDFom (%)	ADFom (%)	ADL (%)	Carboidrati Non Fibrosi NFC (%)	Ammoniaca (ppm)	Ammoniaca (%Pg)	Ac. Lattico (%)	Ac. Acetico (%)	Ac. Butirrico (%)	pH
INSILATO DI MAIS: UMIDITA' inferiore a 64%	61,4	7,58	21,0	2,90	4,21	32,3	41,0	24,5	2,27	44,3	1099	7,46	5,19	0,87	0,14	3,93
INSILATO DI MAIS: UMIDITA' tra 64 e 68%	66,2	7,74	21,9	2,93	4,43	30,4	42,2	25,6	2,29	42,7	1190	7,62	6,21	1,02	0,18	3,84
INSILATO DI MAIS: UMIDITA' superiore a 68%	70,3	7,97	23,9	2,82	4,81	27,0	45,0	27,7	2,47	39,4	1244	7,78	6,83	1,21	0,23	3,82
INSILATO DI MAIS: completo	66,5	7,78	22,4	2,88	4,51	29,7	42,9	26,1	2,34	41,8	1189	7,77	6,19	1,05	0,19	3,86
INSILATO DI MAIS: RACCOLTO 2015	67,0	7,79	22,1	2,93	4,53	27,7	43,9	27,2	2,44	40,8	1161	7,66	6,39	1,05	0,14	3,86
INSILATO DI MAIS: RACCOLTO 2016	66,0	7,53	21,4	3,08	4,42	29,8	42,4	26,2	2,46	42,6	1064	7,26	6,08	1,01	0,13	3,88
INSILATO DI MAIS: RACCOLTO 2017	66,9	7,82	21,9	3,08	4,62	28,6	42,8	26,2	2,33	41,7	1102	7,25	6,48	0,99	0,13	3,84
INSILATO DI MAIS: RACCOLTO 2018	65,6	7,88	21,4	3,05	4,43	30,2	42,1	25,1	2,46	42,5	1056	6,88	5,98	1,06	0,20	3,85
INSILATO DI MAIS: RACCOLTO 2019	66,9	7,85	23,5	2,68	4,60	30,2	43,0	25,8	2,28	41,9	1344	8,81	6,20	1,05	0,25	3,85
INSILATO DI MAIS: RACCOLTO 2020	66,4	7,69	23,5	2,66	4,43	31,7	42,7	25,7	2,31	42,6	1178	7,87	5,61	1,05	0,24	3,90
PASTONE GRANELLA DI MAIS	28,6	8,8	3,0	3,70	1,36	71,1	6,2	1,82		80,0	750,5	4,3	2,30	0,25	0,05	4,08
PASTONE INTEGRALE DI MAIS	40,8	8,2	7,5	3,40	1,91	59,5	17,2	7,87		69,3	915,3	5,7	3,11	0,41	0,08	3,91